

Link do produktu: <http://www.czteryporyroku.sklep.pl/enterosgel-oczyszczanie-organizmu-z-toksyn-p-5.html>



Enterosgel Oczyszczanie organizmu z toksyn

Cena **103,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Opis produktu

Opis

Enterosgel, zawiesina doustna, 225 g to wyrób medyczny klasy IIa w postaci zawiesiny doustnej, przeznaczony do leczenia objawowego ostrej biegunki i chronicznej biegunki w zespole jelita drażliwego (IBS).

Właściwości

- Adsorbent jelitowy Enterosgel.
- Wyrób medyczny klasy IIa.
- Do stosowania w ostrych i chronicznych biegunkach w [zespole jelita drażliwego](#) (IBS).
- Nie zawiera konserwantów, barwników, glutenu, tłuszczów, cukru, laktozy, aromatów.
- Nie zawiera składników pochodzenia roślinnego ani zwierzęcego.

Enterosgel to jelitowy adsorbent w postaci zawiesiny doustnej (enterosorbent). Jego działanie opiera się na bazie minerału organicznego, który posiada zdolność adsorpcyjną w odniesieniu do niektórych toksyn i szkodliwych substancji w jelicie (takich jak endotoksyny, enterotoksyny). Mechanizm działania polega na fizycznym wiązaniu ich na swojej powierzchni, a w następstwie zmniejszeniu częstości oddawania stolca oraz skróceniu utrzymywania się biegunki. Enterosgel jest wydalany z organizmu ze stolcem, a wraz z nim usuwane są adsorbowane toksyny i substancje szkodliwe, co może korzystnie wpływać na efekt leczenia wskazanych stanów ostrej biegunki i

przewlekłej biegunki w zespole jelita drażliwego.

Jak stosować Enterosgel?

- Enterosgel przyjmować doustnie między posiłkami.
- Enterosgel należy przyjmować 2 godziny przed lub po zżyciu leków doustnych.

Należy pamiętać, że osoby przyjmujące inne leki przed rozpoczęciem stosowania wyrobu Enterosgel powinny skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

- Enterosgel należy stosować przez 3 do 5 dni, podczas ostrej biegunki i przez okres do 21 dni w razie przewlekłej biegunki.

Nie przekraczać zalecanego okresu leczenia i nie stosować razem z posiłkami, tak aby nie nastąpił ewentualny niedobór witamin lub składników odżywczych.

- Przed podaniem wyrobów medycznych Enterosgel należy rozprowadzić w wodzie o temperaturze pokojowej.

Kiedy nie stosować Enterosgel?

Nie należy stosować wyrobu medycznego Enterosgel:

- u osób, które stosują jednocześnie leki doustne o modyfikowanym (kontrolowanym) uwalnianiu,
- u osób, które cierpią na atonię jelit (poważne zaparcia wywołane przez obstrukcję jelit), albo niedrożność jelit,
- lub u osób z nietolerancją na którykolwiek ze składników preparatu
- w razie ostrego zatrucia chemicznego, zatrucia lekami lub w razie przedawkowania leków.

Czy Enterosgel można stosować w ciąży i podczas karmienia piersią?

Enterosgel może być podawany w trakcie ciąży i karmienia piersią. Kobiety, które źle się czują w trakcie ciąży lub karmienia piersią, powinny skonsultować się z lekarzem. Brak danych klinicznych dotyczących stosowania wyrobu Enterosgel w pierwszym trymestrze ciąży. Przed podaniem należy skonsultować się z lekarzem.

Skład

Skład: Polymethylsiloxane polyhydrate (hydrożel kwasu metylokrzemowego) - 70 %, woda oczyszczona - 30 %.

Enterosgel nie zawiera cukru, słodzika, laktozy, glutenu, tłuszczów, barwników, aromatów ani konserwantów.

Jak stosować

Dzieci:

- Wiek od 1 do 3 roku życia: przed podaniem wyrobu Enterosgel należy skonsultować się z lekarzem.
- 1-6 lat: 5 g (ok. 1 łyżeczka od herbaty lub 1/3 saszetki) rozprowadzić w 50-100 ml wody, 3x dziennie.
- 7-14 lat: 10 g (ok. 2 łyżeczki od herbaty lub 2/3 saszetki) rozprowadzić w 50-100 ml wody, podawać 3x dziennie.

Dorośli i dzieci powyżej 15 lat:

- 15 g-22,5 g (ok. 1 łyżka stołowa lub 1-1,5 saszetki) rozprowadzić w 200 ml wody, podawać 3x dziennie.

Ważna informacja:

W początkowej fazie leczenia (w pierwszym dniu) można podwoić pierwszą dawkę wyrobu Enterosgel, a następnie podawać poszczególne dawki po każdym stolcu, 3 do 6 razy dziennie. Nie przekraczać 8 dawek w pierwszym dniu.

- Należy przerwać leczenie z użyciem Enterosgela jeżeli w ciągu 1-2 dni nie pojawi się stolec i zwiększyć ilość wypijanej wody, a następnie podjąć leczenie po kolejnym stolcu.
- W leczeniu przewlekłej biegunki dawkowanie można dostosować do konsystencji i częstotliwości oddawania stolca. Można podać nawet podwójną dawkę 3x dziennie,

jeżeli stolec jest rzadki lub obniżyć dawkę do 1 podania dziennie w przypadku normalnego stolca. Nie należy przekraczać 6 dawek dziennie.

Przeznaczenie

Enterosgel stosuje się u dzieci i dorosłych w następujących wskazaniach:

- ostre zapalenie żołądka i jelit (choroby biegunkowe) u dorosłych i dzieci
- choroby alergiczne z objawami żołądkowo-jelitowymi u dorosłych i dzieci
- zespół drażliwego jelita typu biegunkowego (IBS-D).

Ostrzeżenia

Tubę należy dobrze wstrząsnąć przed otwarciem i przed każdym użyciem. Podczas wyciskania wyrobu Enterogel z tuby może pojawić się niewielka ilość płynu. Po otwarciu i każdym użyciu należy dobrze dokręcić wieczko tuby, aby zapobiec wysychaniu i zanieczyszczeniu przez bakterie. Wyrób Enterosgel zużyć w ciągu 30 dni po otwarciu tuby.

Zużyte opakowanie wyrzucić do właściwego kontenera. Opakowanie nadaje się do recyklingu.

Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Nie używać wyrobu po upływie terminu ważności.

Nie używać wyrobu z uszkodzonym opakowaniem.

Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Nie przekraczać zalecanej dawki.

Środki ostrożności

- W leczeniu biegunki u dzieci powinno się jak najwcześniej podać doustny roztwór nawadniający, aby zapobiec odwodnieniu.
- W trakcie leczenia dorosłych z użyciem Enterosgelu zaleca się podawanie doustnego roztworu nawadniającego w celu zapewnienia właściwego nawodnienia organizmu.
- Jeżeli objawy biegunki utrzymują się dłużej niż 2 dni, należy skonsultować się z lekarzem.
- Jeżeli pojawi się gorączka, krew w stolcu, objawy odwodnienia, sześć lub więcej stolców w ciągu ostatnich 24 godzin, lub jeżeli bieguncę towarzyszą wymioty czy silne albo nieustępliwe bóle brzucha, należy niezwłocznie udać się do lekarza, zwłaszcza w przypadku dzieci.

Możliwe skutki uboczne

nudności, wymioty, zaparcia.

Waga

225 g netto

Dystrybutor

In Novation Sp. z o.o.
ul. Limanowskiego 1A/12
32-020 Wieliczka

Producent

Bioline Products s.r.o.
Krakovská 1338/10
110 00 Praha 1, Czechy

Typ produktu

wyrob medyczny