

Link do produktu: <http://www.czteryperyroku.sklep.pl/salicortex-60-tabletek-p-345.html>



Salicortex 60 tabletek

Cena	16,00 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

SALICORTEX

Działanie:

Kora wierzby wykazuje działanie **przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwgorączkowe**.

Wskazania do stosowania:

Tradycyjnie stosowany w celu **łagodzenia bólów kostno-stawowych** o niewielkim nasileniu, **bólów głowy i gorączki** towarzyszącej przeziębieniu. Tradycyjny produkt leczniczy roślinny do stosowania w wymienionych wskazaniach, wynikających wyłącznie z jego długotrwałego stosowania.

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na korę wierzby, salicylany lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (np. w przeszłości obrzęk naczynioruchowy, skurcz oskrzeli lub przewlekła pokrzywka po zastosowaniu salicylanów lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych), astmy, czynnej choroby wrzodowej, trzeciego trymestru ciąży, ciężkich zaburzeń wątroby i/lub nerek, zaburzeń krzepnięcia krwi, wrzodu żołądka i/lub dwunastnicy, niedoboru dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej.

Środki ostrożności związane ze stosowaniem:

Produkt nie jest przeznaczony do leczenia ostrych stanów zapalnych stawów. Jeśli gorączka przekroczy 39°C, utrzymuje się lub związana jest z silnym bólem głowy, bądź objawy nasilają się podczas stosowania, należy skonsultować się z lekarzem. Nie zaleca się równoczesnego stosowania z salicylanami i innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi bez konsultacji z lekarzem.

Interakcje z innymi produktami leczniczymi oraz inne rodzaje interakcji:

Kora wierzby może nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych, takich jak pochodne kumaryny.

Ostrzeżenia specjalne:

Stosowanie leku u dzieci:

Nie należy stosować poniżej 18 roku życia.

Ciąża i karmienie piersią:

Nie jest zalecane stosowanie w pierwszym i drugim trymestrze ciąży oraz podczas laktacji. Salicylany przechodzą przez łożysko i do mleka matki. Przeciwwskazane w trzecim trymestrze ciąży.

Wpływ na prowadzenie pojazdów i obsługiwane maszyn:

Nieznanym wpływ.

Dawkowanie, sposób stosowania i droga podania:

Doustnie, dorośli: 1 tabletkę 3 razy dziennie po jedzeniu. Zaleca się popicie dużą ilością ciepłego płynu.

Czas stosowania produktu leczniczego:

- łagodzenie bólów kostno-stawowych - maksymalnie do 4 tygodni,
- bóle głowy - 1 dzień,
- gorączka towarzysząca przeziębieniu - 3 dni.

Jeśli objawy nie ustępują w trakcie stosowania leku lub nasilają się, należy skonsultować się z lekarzem.

Przedawkowanie:

W przypadku przedawkowania leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Postępowanie w przypadku pominięcia dawki leku:

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W celu uzyskania wyjaśnień co do stosowania leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Działania niepożądane

Mogą wystąpić objawy nadwrażliwości, takie jak wysypka, świąd, pokrzywka, astma, wykwit oraz objawy ze strony układu pokarmowego, takie jak nudności, wymioty, bóle brzucha, niestrawność, zgaga i biegunka. Częstość nie jest znana. W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych należy poinformować o nich lekarza lub farmaceutę.

Przechowywanie leku:

Przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w temperaturze nie wyższej niż 25°C, w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności.

Skład leku:

Salicis cortex - 330 mg

Substancje pomocnicze: skrobia ziemniaczana, krzemu dwutlenek koloidalny bezwodny(substancja przeciwbrylająca).

Jedna tabletkę zawiera nie mniej niż 20 mg glikozydów fenolowych w przeliczeniu na salicynę.

Podmiot odpowiedzialny:

Laboratorium Farmaceutyczne Labofarm Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Lubichowska 176 b

83-200 Starogard Gd.

tel. 058 561 20 08

fax 058 561 20 16

e-mail: poczta@labofarm.com.pl

Wytwórca:

Labofarm

ul. Lubichowska 176 b

83-200 Starogard Gd.

Data zatwierdzenia tekstu ulotki: 22.03.2012