Dane aktualne na dzień: 19-03-2024 04:17

Link do produktu: http://www.czteryporyroku.sklep.pl/tabletki-przeciw-niestrawnosci-20-tabletek-p-347.html



Tabletki przeciw niestrawności 20 tabletek

Cena	**9,96 zł**
Cena poprzednia	~~**10,00 zł**~~
Dostępność	**Dostępny**

Opis produktu

TABLETKI PRZECIW NIESTRAWNOŚCI

Działanie:
Produkt pobudza wydzielanie soków trawiennych oraz żółci. Wykazuje łagodne **działanie rozkurczające, wiatropędne.**

Wskazania do stosowania:
Tradycyjnie w dolegliwościach związanych z zaburzeniami procesu trawienia, takimi jak: uczucie **pełności w żołądku**, **wzdęcia**, zbyt małe wydzielanie żółci i soku żołądkowego.
Tradycyjny produkt leczniczy roślinny do stosowania w wymienionych wskazaniach, wynikających wyłącznie z jego długotrwałego stosowania.

Przeciwwskazania:
Nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na korę kruszyny lub związki antranoidowe, a także w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek z pozostałych składników leku.
Nie należy stosować również w przypadku niedrożności jelit lub dróg żółciowych, bólów brzucha o nieustalonej etiologii, ostrych schorzeń zapalnych jelit, zapalenia wyrostka robaczkowego, zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej.

Środki ostrożności związane ze stosowaniem:
Produkt nie jest przeznaczony do długotrwałego stosowania. Decyzję o stosowaniu przez okres dłuższy niż 7-14 dni może podjąć lekarz.

Interakcje z innymi produktami leczniczymi oraz inne rodzaje interakcji:
Brak danych.

Ostrzeżenia specjalne:
Stosowanie u dzieci:
Nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.
Ciąża:
Ze względu na brak danych nie jest zalecane stosowanie w ciąży.
Karmienie piersią:
Z uwagi na możliwość przechodzenia niektórych składników do mleka, nie jest zalecane stosowanie w okresie karmienia piersią.
Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn:
Nie ma wpływu.

Dawkowanie:
Doustnie. Dorośli, osoby w wieku podeszłym i młodzież powyżej 12 lat: 2 tabletki do 3 razy dziennie.
Tabletki przyjmować po posiłku, popijając wodą.
Przedawkowanie:
Przedawkowanie wywołuje biegunkę z możliwością utraty elektrolitów, w szczególności jonów potasu. W przypadku przedawkowania należy uzupełnić niedobór płynów i elektrolitów.

Postępowanie w przypadku pominięcia dawki leku:
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W celu uzyskania wyjaśnień, co do stosowania leku, należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Działania niepożądane:
Dotychczas nie odnotowano. W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych, należy poinformować o nich lekarza.

Przechowywanie leku:
Przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w temperaturze nie wyższej niż 25ºC, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie stosować preparatu po upływie terminu ważności.

Skład leku: korzeń mniszka - 100 mg, owoc kminku - 50 mg, liść mięty pieprzowej - 60 mg, kora kruszyny - 60 mg, rafinowany i standaryzowany wyciąg suchy z ostropestu o zawartości 58%±10% sylimaryny w przeliczeniu na sylibininę (ekstrahent: aceton 95%) - 7 mg.
Substancje pomocnicze: skrobia ziemniaczana, krzemionka koloidalna bezwodna.
Jedna tabletka zawiera 3,61-3,99 mg związków antranoidowych w przeliczeniu na glukofrangulinę A.

Podmiot odpowiedzialny:
Laboratorium Farmaceutyczne Labofarm Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Lubichowska 176 b
83-200 Starogard Gd.
tel. 58 561 20 08
fax 58 561 20 16
e-mail: poczta@labofarm.com.pl
Wytwórca:
Labofarm
ul. Lubichowska 176 b
83-200 Starogard Gd.

Data zatwierdzenia tekstu ulotki: 14.07.2011