

Link do produktu: <http://www.czteryperyroku.sklep.pl/colon-c-az-medica-zdrowe-jelita-100-g-p-426.html>



Colon C AZ Medica Zdrowe jelita 100 g

Cena	14,90 zł
Cena poprzednia	20,00 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

Colon C AZ Medica Zdrowe jelita Suplement diety 100 g

Właściwości Colon C

- reguluje pracę jelit
- zapobiega zaparciom
- dostarcza: błonnika, probiotyków i prebiotyków

COLON C dzięki wyjątkowej kompozycji opartej na naturalnych składnikach, ułatwia perystaltykę jelit. Jest zdobywcą Nagrody Zaufania Konsumentów - Złotego Otisa 2007, od 10 lat znany na rynkach europejskich.

Zawiera łupiny nasion babki płesznik (*Plantagopsyllium husk*), fruktooligosacharydy i przyjazne bakterie z rodzaju *Lactobacillus acidophilus* i *Bifidobacterium*. Takie połączenie jest optymalne dla jelit.

Łupiny nasion babki płesznik dostarczają błonnika. Jest to nierozpuszczalne włókno roślinne pęczniejące w przewodzie pokarmowym. Zwiększając swoją objętość, pobudzają motorykę jelit, przyspieszają przesuwanie wypełniającej je masy. Błonnik w jelitach sprzyja także rozwojowi przyjaznych bakterii, które wpływają na prawidłowe funkcjonowanie całego organizmu.

Bakterie z rodzaju *Lactobacillus* (probiotyki) odgrywają ważną rolę w przewodzie pokarmowym, gdyż pomagają w zachowaniu homeostazy w przewodzie pokarmowym, ograniczając rozwój chorobotwórczych bakterii.

Fruktooligosacharydy (prebiotyki) zawarte w Colon C są drugim - obok probiotyków czynnikiem sprzyjającym równowadze flory jelitowej. Badania naukowe prowadzone m.in. w USA i Japonii dowodzą, iż fruktooligosacharydy modyfikują florę jelitową i zwiększają populację pożytecznych bakterii.

Substancje o działaniu odżywczym i/lub fizjologicznym:

Łupiny nasion babki płesznik (*Plantago psyllium husk*), fruktooligosacharydy, *Lactobacillus acidophilus*, *Lactobacillus bifidus*.

Sposób użycia:

2 razy dziennie po 1 czubatej łyżeczce (5 g) - jedną przed śniadaniem, drugą przed kolacją. Zmieszać z wodą lub sokiem owocowym i natychmiast wypić. Istotne jest, by popić preparat dodatkową szklanką wody lub soku. Po dwóch tygodniach można zmniejszyć ilość preparatu o połowę. Preparat nie może stanowić substytutu zróżnicowanej diety. Nie należy przekraczać zalecanej porcji. Chronić przed dziećmi.